

КАЛЕНДАР ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЩЕПЛЕНЬ

Щеплення проти	2 доби	2 місяці	4 місяці	6 місяців	12 місяців	18 місяців	4 роки	6 років	Дівчата 12 – 13 років	16 років	Дорослі
 ГЕПАТИТУ В ¹		1-а доза	2-а доза	3-я доза		4-а доза					
 ТУБЕРКУЛЬОЗУ ²	Одна доза										
 КАШЛЮКА, ДИФТЕРІЇ, ПРАВЦЯ ³		1-а доза	2-а доза	3-я доза		4-а доза		дп		дп	дп
 ПОЛІОМІЄЛІТУ ⁴		1-а доза (ІПВ)	2-а доза (ІПВ)	3-я доза (ІПВ)		4-а доза (ІПВ)		ІПВ			
 ІНФЕКЦІЇ, СПРИЧИНЕНОЇ НАЕМОФІЛУС ІNFLUENZAE ТИПУ В ⁵		1-а доза	2-а доза	3-я доза		4-а доза					
 КОРУ, ЕПІДЕМІЧНОГО ПАРОТИТУ, КРАСНУХИ ⁶					1-а доза		2-а доза				
 ПАПІЛОМАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ ⁷									Одна доза		

¹ Планові профілактичні щеплення дітей проти гепатиту В проводяться у віці 2 місяці (1-а доза), 4 місяці (2-а доза), 6 місяців (3-я доза) та 18 місяців (4-а доза) незалежно від маси тіла при народженні.

² Щепленню для профілактики туберкульозу підлягають усі новонароджені діти, що не мають до цього протипоказань. Щеплення проводиться через 24 години від народження до виписки з пологового стаціонару вакциною для профілактики туберкульозу (далі — БЦЖ). Передчасно народжені діти, які народилися в строк гестації понад 31 тиждень, та діти з низькою вагою при народженні (<2500 г, але не <2000 г), підлягають щепленню БЦЖ. В іншому випадку щеплення проводиться після досягнення дитиною маси тіла 2000 г.

³ Щеплення для профілактики дифтерії, правця та кашлюка проводяться за віком: у 2 місяці (1-а доза), у 4 місяці (2-а доза), у 6 місяців (3-я доза) та у 18 місяців (4-а доза).

⁴ Вакцинація дітей для профілактики поліомієліту проводиться за віком: 2 місяці (1-а доза), 4 місяці (2-а доза), 6 місяців (3-я доза), 18 місяців (4-а доза) та 6 років (5-а доза). Для профілактики поліомієліту застосовується інактивована поліомієлітна вакцина (далі — ІПВ). ІПВ може бути застосована як окремо, так і в складі комбінованих вакцин.

⁵ Щеплення для профілактики інфекції, спричиненої Haemophilus influenzae типу b (далі — НіВ-інфекція), проводиться за віком: у 2 місяці (1-а доза), 4 місяці (2-а доза), 6 місяців (3-я доза) та в 18 місяців (4-а доза) життя. Для вакцинації дітей для профілактики НіВ-інфекції використовуються як моновакцини, так і комбіновані вакцини, що містять НіВ-компонент. Планова вакцинація проводиться дітям до 4 років 11 місяців 29 днів.

⁶ Вакцинація дітей для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи проводиться у віці 12 місяців (1-а доза) та у 4 роки (2-а доза).

⁷ Вакцинація проти папіломавірусної інфекції (далі — ВПЛ) проводиться дівчатам у віці від 12 років до 13 років 11 місяців 29 днів, починаючи з 01 січня 2026 року. Дівчатам, які живуть з ВІЛ, та дітям, які постраждали від сексуального насильства, вакцинацію проти ВПЛ слід проводити якомога раніше, починаючи з 9 років.